

Краткая Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Форлакс[®], порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 10 г. Соответствует ВИ к ИМП №7 от 10.01.2023.

Краткая инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата ФОРЛАКС[®] (FORLAX[®]). Регистрационный номер: П N014670/01. МНН: макрогол. **Форма выпуска:** порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 10 г (в пакетиках, по 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 или 30 пакетиков вместе с инструкцией по применению в картонной пачке). **Фармакотерапевтическая группа:** осмотическое слабительное средство (макрогол). **Код АТХ:** А06АD15. **Фармакологические свойства:** макрогол 4000 удерживает молекулы воды посредством водородных связей, что приводит к увеличению объема кишечного содержимого. **Показания к применению:** симптоматическое лечение запоров у взрослых и детей с 8 лет и старше. **Противопоказания:** серьезные воспалительные заболевания кишечника (такие как язвенный колит, болезнь Крона) или токсический мегаколон; перфорация или угроза перфорации желудочно-кишечного тракта; кишечная непроходимость или подозрение на кишечную непроходимость; симптоматический стеноз; боли в животе неясной этиологии; гиперчувствительность к макроголу (полиэтиленгликолю) или любому из компонентов препарата; дети младше 8 лет. **Применение при беременности и в период грудного вскармливания:** Форлакс[®] можно принимать во время беременности и в период грудного вскармливания. **Способ применения и дозы:** внутрь, у взрослых и детей с 8 лет и старше. Содержимое 1-2 пакетов (10-20 г) в день, по 1 пакету утром (1 пакет в день) или по 1 пакету утром и вечером (2 пакета в день). Содержимое каждого пакета следует растворить в 50 мл воды непосредственно перед приемом. Эффект от приема препарата Форлакс[®] выражен в течение 24 – 48 часов после приема препарата. Рекомендуемый курс лечения для детей и взрослых – 3 месяца. Перед приемом препарата необходимо ознакомиться с полной инструкцией по медицинскому применению. **Побочное действие:** часто – вздутие живота, боль в животе, диарея, тошнота, расстройства электролитного баланса (гипонатриемия, гипокалиемия) и/или обезвоживание, особенно у пожилых пациентов. **Условия хранения:** при температуре не выше 30 °С, в недоступном для детей месте. **Срок годности:** 3 года. **Условия отпуска:** отпускают без рецепта. **Полная информация содержится в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата Форлакс[®], порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 10 г.** **Производитель:** Бофур Ипсен Индастри, Рю Эте Виртон, 28100 Дрё, Франция. **Владелец регистрационного удостоверения:** ИПСЕН КОНСЬЮМЕР ХЕЛСКЕА, Франция. **Организация, принимающая претензии потребителей:** ООО «ИПСЕН КОНСЬЮМЕР ХЕЛСКЕА», 109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 17-23, тел.: 8 (495) 796-87-68, факс: 8 (495) 796-87-69.

FLX-RU-000202