

Краткая Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Форлакс<sup>®</sup>, порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для детей], 4 г. Соответствует ВИ к ИМП №6 от 10.01.2023.

**Краткая инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата ФОРЛАКС<sup>®</sup> (FORLAX<sup>®</sup>).** Регистрационный номер: ЛС-002549. МНН: макрогол. **Форма выпуска:** порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для детей], 4 г (в пакетиках, по 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 и 30 пакетиков вместе с инструкцией по применению в пачке картонной). **Фармакотерапевтическая группа:** осмотическое слабительное средство (макрогол). **Код АТХ:** А06АD15. **Фармакологические свойства:** макрогол 4000 удерживает молекулы воды посредством водородных связей, что приводит к увеличению объема кишечного содержимого. **Показания к применению:** симптоматическое лечение запоров у детей в возрасте от 6 месяцев до 8 лет. **Противопоказания:** серьезные воспалительные заболевания кишечника (язвенный колит, болезнь Крона) или токсический мегаколон; перфорация или риск перфорации отдела желудочно-кишечного тракта; полная или частичная кишечная непроходимость, а также подозрение на кишечную непроходимость или симптоматический стеноз; боли в животе неясной этиологии; гиперчувствительность к действующему веществу или к любым другим вспомогательным компонентам препарата. **Применение при беременности и в период грудного вскармливания:** Форлакс<sup>®</sup> можно принимать во время беременности и в период грудного вскармливания. **Способ применения и дозы:** внутрь (с 6 месяцев до 1 года: 1 пакетик в день; с 1 года до 4 лет: от 1 до 2 пакетиков в день; с 4 до 8 лет: от 2 до 4 пакетиков в день). Содержимое одного пакетика растворить в 50 мл воды, принимать утром (если дозировка – 1 пакетик в день) или утром и вечером (если дозировка – более 1 пакетика в день). Действие Форлакса<sup>®</sup> проявляется через 24 – 48 часов после приема. Продолжительность лечения – не более 3 месяцев, в связи с недостаточностью клинических данных по применению препарата в течение более чем 3 месяцев. Перед приемом препарата необходимо ознакомиться с полной инструкцией по медицинскому применению. **Особые указания:** данные об эффективности терапии у детей моложе 2-х лет ограничены. **Побочное действие:** часто – боль в животе, диарея. **Условия хранения:** при температуре не выше 30 °С, в недоступном для детей месте. **Срок годности:** 3 года. **Условия отпуска:** отпускают без рецепта. **Полная информация содержится в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата Форлакс<sup>®</sup>, порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для детей], 4 г.** Производитель: Бофур Ипсен Индастри, Рю Эте Виртон, 28100 Дрё, Франция. Владелец регистрационного удостоверения: ИПСЕН КОНСЬЮМЕР ХЕЛСКЕА, Франция. Организация, принимающая претензии потребителей: ООО «ИПСЕН КОНСЬЮМЕР ХЕЛСКЕА», 109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 17-23, тел.: 8 (495) 796-87-68, факс: 8 (495) 796-87-69.

FLX-RU-000201